

# SiderAL® DROPS Int.

Συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron)

Φιαλίδιο 30 ml + 1 φακελίσκος του 1,9 g

**To SiderAL® Drops Int.** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron, SiderAL® r.m.) το οποίο είναι χρήσιμο για την κάλυψη ελλιπούς διαιτητικής πρόσληψης ή αυξημένων αναγκών για το εν λόγω θρεπτικό συστατικό.

**Ο σίδηρος συνεισφέρει στη φυσιολογική γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.**

Ο σίδηρος (SiderAL® r.m.) που περιέχεται στο SiderAL® Drops Int. περνά άθικτος το γαστρεντερικό περιβάλλον και απορροφάται απευθείας από τον εντερικό βλεννογόνο αποφεύγοντας έτσι πιθανούς γαστρικούς ερεθισμούς.

**Πότε χρησιμοποιείται:** To SiderAL® Drops Int. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης, αυξημένης ανάγκης σε σίδηρο ή μειωμένης εντερικής απορρόφησης. Ειδικότερα, το SiderAL® Drops Int. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ανεπάρκειας σιδήρου ή σιδηροπενικής αναιμίας.

**Συστατικά φακελίσκου:** Sideral r.m.- Sucrosomial Iron (iron pyrophosphate, sucrose esters of fatty acids, sunflower lecithin spray-dried on rice flour and tricalcium phosphate, pregelatinised rice starch), maltodextrins. **Χωρίς γλουτένη.**

**Συστατικά φιαλίδιου:** water, sucrose, maltodextrins, flavour, preservatives: potassium sorbate and sodium benzoate; thickening agent: xanthan gum, acidity regulator: citric acid; emulsifier: sucrose esters of fatty acids. **Χωρίς γλουτένη.**

**Ανασύσταση:** 1) Ανοίξτε το φιαλίδιο. **Προσοχή μην πετάξετε το καπάκι.** 2) Τοποθετείστε τη σκόνη στο φιαλίδιο. 3) Βάλτε το καπάκι στο φιαλίδιο (**μην χρησιμοποιείτε το σταγονόμετρο**), κλείστε το καλά και αφήστε το για ένα λεπτό. 4) Ανακινήστε το φιαλίδιο δυνατά. 5) **Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.**

**Οδηγίες χρήσης:** Η συνιστώμενη δόση είναι 10 σταγόνες την ημέρα που ισοδυναμούν με 1ml διαλύματος ή όπως συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό. Χρησιμοποιείστε το σταγονόμετρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το προϊόν μπορεί να ληφθεί απ' ευθείας από το στόμα ή να διαλυθεί σε μισό ποτήρι νερό ή άλλο υγρό που βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Η παρουσία συσσωματωμάτων (σβόλων), αμέσως μετά την ανάδευση, οφείλεται στην παρουσία αντισυσσωματικών παραγόντων στην σκόνη. Συνήθως εξαφανίζονται 10 λεπτά μετά την ανάδευση. Για αυτό συνιστάται το προϊόν να χρησιμοποιείται λίγα λεπτά μετά την ανάδευση.

**Προειδοποίηση:** Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (μικρότερη των 30°C), μακριά από υπερβολική θερμότητα, ηλιακό φως και να αποφεύγεται η επαφή με το νερό. Μετά την ανασύσταση να φυλάσσεται στο ψυγείο στους 4° - 8°C. Χρησιμοποιείστε το μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ανασύσταση. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση σολογία. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μικρότερα των 3 ετών. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ανασύσταση.

Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε σωστά αποθηκευμένο προϊόν στη συνήθη συσκευασία του εμπορίου.

Τα συμπτηρώματα διατροφής δεν πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατα της σωστής, ισορροπημένης διατροφής και του υγεινού τρόπου ζωής. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 114649/09-11-2018. (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ). Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

### Μέση σύσταση

	Ανά δόση 1 ml	ΔΤΑ%
Σίδηρος	7,00 mg	50%

ΔΤΑ% = Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (%NRVs = Nutrients Reference Values)

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό κύτταρο. Είναι το κύριο συστατικό της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και παίζει ένα βασικό ρόλο ως μεταφορέας του οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που η δίαιτα δεν είναι ισορροπημένη και ποικιλή, ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών, είναι απαραίτητη η διόρθωση με συμπτηρώματα θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανομένου και του σιδήρου, ένα χρήσιμο στοιχείο για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο σίδηρος που βρίσκεται στο SiderAL Drops Int. μεταφέρεται μέσα σε φωσφολιπιδική, σουκροσωμική μεμβράνη η οποία προσφέρει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Αυτή η νέα σουκροσωμική τεχνολογία συνεισφέρει στη βελτίωση της ανεκτικότητας από το γαστρεντερικό γιατί ο σίδηρος προστατεύεται μέσα στο σουκρόσωμα και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το γαστρεντερικό βλεννογόνο.

Rev. 3 of 0

Sucrosomial® Iron είναι ένα εγκεκριμένο σήμα

Sucroseome® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα

SiderAL® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα

SiderAL® r.m. είναι ένα συστατικό με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron) με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας



Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: Win Medica A.E.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι - Αττική

Παράγεται από την SIIT σε εργοστάσιο που εδρεύει στην Via Ariosto 50/60 20090 Trezzano S/N (Milano) – Italy για την εταιρεία Junia Pharma S.r.l. Via delle Lenze 216/B – 56122 Pisa – Italy.