

# Retoblock

## Καολίνης με Φρουκτο-ολιγοσπικχαρίτες

Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε το φύλλο οδηγιών, μπορεί να χρειστεί να το διαβάσετε ξανά.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**  
Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της διάφροιας.

**ΣΥΝΘΕΣΗ:**  
1 φακελίακος κοκκίνινο μίας δόσεως (SACHETS) περιέχει 3g καολίνη  
Εκδόση: φρουκτο-ολιγοσπικχαρίτες, πολυβινολοπυρρολιδόνη, όρωμα μπανάνας, μαλτοδεξτρίνη, σουκραλόζη, διωξείδιο του πυριτίου.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**  
Η συσκευασία περιέχει 14 φακελίσκους κοκκίνινα για πόσιμο εναιώρημα.

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:**  
FINEFOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A.

**ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ:**  
Win Medica A.E.  
Οιδιποδός 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 748821  
[www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
Τα κοκκίνια περιέχουν καολίνη.  
Ο καολίνης είναι ένας άργυρος ο οποίος έχει ιδιότητες απορρόφησης χάρη στη δομή και την ανόργανη σύνθεσή του. Κατά συνέπεια τα υγρά και άλλες δυνητικά επιβλαβείς ουσίες (π.χ. βακτήρια και συντροποξεις) απορροφούνται μπρινικά, περικλείονται εντός και τα κοπράνα αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή. Ο καολίνης σε περίπτωση διάφροιας, βοηθά στην αύξηση της συνοχής των κοπράνων σε διάστημα 24 και 48 ωρών.

Το προϊόν περιέχει φρουκτο-ολιγοσπικχαρίτες (FOS). Χάρη στα χαρακτηριστικά τους οι FOS προάγουν την ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας σε ασθενείς με διάφροια.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ:**  
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ολεργίας σε ένα ή περισσότερα αυτοτικά.  
Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση σε ασθενείς με γαστρικές ή εντερικές βλάβες ή/και ασθενείς με χρόνια δυσκολιότητα, απόφραξη ή εντερικό ερεθισμό.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΩΠΟΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:**  
Ρυπήστε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση σε περίπτωση διάφροιας συνοδευόμενης από πυρετό, αίμα στα κοπράνα ή σε περιπτώσεις όπου η διάφροια διαρκεί πάνω από 2 ημέρες. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν για περισσότερο από 2 ημέρες. Συνιστάται να συμβουλεύετε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε παιδιά κατόν των 3 ετών. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επιβλεψη ιατρού κατά τη διάρκεια της κύπης και της γαλούχιας. Το ιατρικό σκεύασμα περιέχει καολίνη, ένα φυσικό πτρό από ένιδρο πυρητικό αργιλίο. Θα πρέπει να συμβουλεύετε τον ιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε άλλα προϊόντα που περιέχουν άλατα αργιλίου.

**ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΑΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ:**  
Το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 3 ώρες πριν ή μετά τη λήψη άλλων φαρμάκων.  
Ο καολίνης, λόγω των απορροφητικών ιδιοτήτων μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη γαστρεντερική απορρόφηση διαφόρων φαρμάκων με επακόλουθη μείωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητάς τους.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:**  
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εκτός εάν έχετε διαφορετική σύσταση από τον ιατρό.  
Είναι σημαντικό να τηρηθούν και να ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό.  
- Ενήλικες: από 2 έως 4 φακελίσκους την ημέρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα για 24 ώρες.  
- Παιδιά μετέξει 3 και 12 ετών: 1 φακελίσκος την ημέρα.  
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών.  
Εάν το παιδί σας είναι γλυκιάς κάτω των 3 ετών, ζητήστε τη συμβούλη του ιατρού σας.  
Αδειάστε τα κοκκίνια σε ένα ποτήρι νερού (200 ml). Ανακατέψτε καλά πριν τη λήψη.  
Η διάρκεια της αγωγής εξαρτάται από την ίδια την κατάσταση και την ανταποκρίση στην αγωγή. Ωστόσο, συνιστάται η επικονιώση με τον ιατρό σας σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιψένουν.  
Μην υπερβαίνετε τη συνισταμένη δόση.

**ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:**  
Δεν υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις υπερδοσολογίας κατά τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.  
Στη περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης του προϊόντος, επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

**ΑΝΕΠΙΟΥΗΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:**  
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν κυρίως τη γαστρεντερική οδό. Μπορεί να προκαλέσει μετεωρισμό, διάταση κοιλιάς, δυσκολοποίηση και καυτά που συνήθως εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνιστάται να επικοινωνήσετε άμεσως με τον ιατρό σας σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**  
Η πιερορυμητική λήξης του προϊόντος είναι τυπωμένη πάνω στο φακελίσκο. Μην το χρησιμοποιείται μετά την πιερορυμητική λήξης. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν εντός της συσκευασίας έχει ανοιχθεί ή καταστραφεί. Το προϊόν περιέχει φακελίσκους μιας χρήσεως. Μην ξαναχρησιμοποιείτε φακελίσκους μερικών χρησιμοποιημένους.

Να φυλάσσεται το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.  
Να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά.  
Αποφύγετε την απόρριψη του στο περιβάλλον.

Πληροφορίες ενημέρωσης:  
03/2016

CE 0426

FINEFOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A.

Via Berlino 39 - 24040 Zingonia Verdellino (BG) - ITALY

Μίας χρήσης

WinMedica

Serving Health for Life