

Όλλο οδηγών χρίσης: Πάρωση από τον χριστό

TOPRESS PLUS® 20 mg/5 mg/12,5 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
TOPRESS PLUS® 40 mg/5 mg/12,5 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
TOPRESS PLUS® 40 mg/5 mg/25 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
TOPRESS PLUS® 40 mg/12,5 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
TOPRESS PLUS® 40 mg/10 mg/25 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

μεδοζολμική ολιμεσαρτίνη/αρλοδιπίνη/υδροχλωροθειαζίδη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περάσει απόρρητες ρυθμίσεις του νεφρού ή τον φαρμακοποιοί σας.
- Η πονογή ή/και το φάρμακο χορηγείται αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, αν και είναι το φάρμακό τους. Ακόμα κι αν τους πείτε ότι είναι ένα χάπι για να πιουν σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιοί σας. Αυτό ισχύει και για κάθε μηθύνη ανεπιθύμη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

- Τι είναι το TOPRESS PLUS® και ποια είναι η χρήση του
- Πότε να παίρνετε πριν πάρετε το TOPRESS PLUS®
- Πώς να πάρετε το TOPRESS PLUS®
- Πόσους ανεπιθύμητες ενέργειες
- Πώς να φυλάξετε το TOPRESS PLUS®
- Περιγραφή της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το TOPRESS PLUS® και ποια είναι η χρήση του

Το TOPRESS PLUS® περιέχει τρεις δραστικές ουσίες, που αναφέρονται μεδοζολμική ολιμεσαρτίνη, αρλοδιπίνη (ως βενζιλική αρλοδιπίνη) και υδροχλωροθειαζίδη. Και οι τρεις ουσίες βοηθούν στον έλεγχο των υψηλών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης.

Η μεδοζολμική ολιμεσαρτίνη ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζεται «Η υποδομή των υποδοξείν της αγγειοσυσπλν», η οποία μειώνει την αρτηριακή πίεση μέσω χαλάρωσης των αμφορών αγγείων.

Η αρλοδιπίνη ανήκει σε μία ομάδα ουσιών που ονομάζεται «ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου». Η αρλοδιπίνη, επίσης, μειώνει την αρτηριακή πίεση μέσω χαλάρωσης των αμφορών αγγείων.

Η υδροχλωροθειαζίδη ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «θεοειδή διουρητικά (-δισκία που αποβάλλουν ύδαρ)». Μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθώντας το σώμα να απαλλαγεί από επιπλέον υγρά κίνησης, τους νεφρούς να παράγουν περισσότερο ούρα.

Οι δράσεις αυτών των ουσιών συμβάλλουν στο να ελαττώνεται η αρτηριακή πίεση.

Το TOPRESS PLUS® χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

- Εστε ανάλογα ασθενείς, των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με το συνδυασμό σταθερής δόσης μεδοζολμικής ολιμεσαρτίνης και αρλοδιπίνης, ή σε ασθενείς, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν έναν συνδυασμό σταθερής δόσης μεδοζολμικής ολιμεσαρτίνης και υδροχλωροθειαζίδης συν τη αρλοδιπίνη, ως ξεχωριστό δισκίο ή συνδυασμό σταθερής δόσης μεδοζολμικής ολιμεσαρτίνης και αρλοδιπίνης συν την υδροχλωροθειαζίδη, ως ξεχωριστό δισκίο.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το TOPRESS PLUS®

Μην πάρετε το TOPRESS PLUS® εάν:

- Είστε αλλεργικοί στην μεδοζολμική ολιμεσαρτίνη, στην αρλοδιπίνη ή σε μία εστία ομάδα των αποκλειστών των διαύλων ασβεστίου (της διουρητικών), ή στην υδροχλωροθειαζίδη ή σε άλλες ουσίες παρόμοιες της υδροχλωροθειαζίδης (ουροσημονικές) ή σε οποιοδήποτε άλλο από το συστατικό αυτού του φαρμάκου (αναφέρεται στην παράγραφο 6). Αν πιστεύετε ότι πιθανώς είστε αλλεργικοί, πριν λάβετε το TOPRESS PLUS®, μιλήστε με τον γιατρό σας.
- Έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα.

• Έχετε σοβαρή ή μεμονωμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε θεραπεία για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, που περιέχει αλκοόλη.

• Έχετε μειωμένο κάλιο, μειωμένο νάτριο, αυξημένο ασβέστιο ή αυξημένο ουρικό οξύ (με συμπτώματα πόνου αρθρίτιδας ή νεφρολιθίασης), τα επίπεδα στο αίμα σας δεν βελτιώνονται όταν λαμβάνετε θεραπεία.

• Είναι έγκυος, περιμένετε να έχετε ένα μωρό ή είναι καλή ώρα να αποφύγετε το TOPRESS PLUS® στα αρχικά στάδια της κύησης – βλέπε παράγραφο «Κύηση και θηλασμός».

• Έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα, εάν η έκκριση της χολής είναι μειωμένη ή η παραγωγή της χολής από τη χοληφόρο κύστη είναι αποκατεμένη (π.χ. πέτρες στη χολή) ή εάν έχετε έκτερο (κίτρινη απόχρωση του δέρματος και των ματιών).

• Έχετε κακή παροχή αίματος στους ιστούς σας, με συμπτώματα όπως χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλό ορατό, ταχυκαρδία ή καταπληξία (συμμεταβολισμένης της καρδιακής κατάστασης, η οποία σημαίνει καταπληξία λόγω σοβαρών καρδιακών προβλημάτων).

• Έχετε πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση.

• Η ροή αίματος από την καρδιά σας είναι αργή ή παρεμποδίζεται. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν τα αμοφόρα αγγεία ή η βαλβίδα, η οποία απομακρύνει το αίμα από την καρδιά σας, έχει στενθεί (στένωση της αορτής).

• Έχετε χαμηλή καρδιακή παροχή μετά από καρδιακή προσβολή (δύο εβδομάδα τουλάχιστον). Η χαμηλή καρδιακή παροχή μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε δύσκολα στην αναπνοή ή πρήξιμο στα πόδια σας και τους αστραγάλους σας.

Μην λαμβάνετε το TOPRESS PLUS® αν σας συμβαίνει κάποιο από τα ανωτέρω.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Πλευθυθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιοί ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το TOPRESS PLUS®.

Εάν παρατηρήσετε μείωση της όρασης ή οφθαλμικό πόνο: Θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα *αυτοάνοσης κυρίως στην εγκυτική επιδόση του οφθαλμού (αποδόση λυγροειδούς)* ή αύξηση της πίεσης στον οφθαλμό και μπορεί να συμβεί εντός ωρών έως εβδομάδες από τη λήψη του TOPRESS PLUS®.

Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν πάρετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:
• εάν συντακτεί το Μεταπραζολικό Εξέλιου της Αφροαίνης (α-MEA) (για παράδειγμα ενκαπσάλιο, λισινοπρίλη, ραμιπρίλη). Είστε εάν έχετε σχετιζόμενα με αναπνευστικό διπλόη πρόβλημα με τους νεφρούς.
• αλοκαθένη.

Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή πίεση, και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Βλέπε επίσης τις πληροφορίες στο «Μην πάρετε TOPRESS PLUS® εάν».

Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν έχετε αποδορίστε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας:

- Προβλήματα στους νεφρούς ή μεταμόσχευση νεφρού.
- Ασθένεια του ήπατος.
- Καρδιακή ανεπάρκεια ή προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδιάς σας ή τον καρδιακό μυ.
- Έντονος εμετός, διάρροια, έσπε υπό θεραπεία με υψηλές δόσεις διουρητικών ή αν είστε σε χαμηλή σε αλάτι διαίτα.
- Αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα σας.
- Προβλήματα με τα επινεφρίδια (αδένες που παράγουν ορμόνες και βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς).
- Διαβήτη.
- Ερυθρεμάτη ή λίκιο (μία αυτοάνοση νόσος).
- Αλλεργίες ή άσθμα.
- Λεμφοπενία ουνοειδών, όπως ήλικος ήγκωμα ή εξάνθημα μετά από έκθεση στον ήλιο ή τη χρήση ζεστού νερού.
- Αν έχετε εμφανίσει καρκίνο του δέρματος στο παρελθόν ή αν εκδηλώσετε μη αναμενόμενες δερματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη, ιδίως για μακροχρόνια χρήση σε υψηλές δόσεις, εδέχεται να αείρει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων τύπων καρκίνου του δέρματος και των μελών (μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος). Προστατέψτε το δέρμα σας από την ηλιακή και την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη λήψη του TOPRESS PLUS®.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:

- Λιγάρω που είναι σοβαρή, επίμονη και προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους.
- Ο γιατρός σας μπορεί να αξιολογήσει το συμπτωμάτός σας και να αποφασίσει πώς να συνεχίσετε να λαμβάνετε το αντιυπετασικό σας φάρμακο.
- Επιδείνωση της όρασης ή πόνο στον οφθαλμό. Αυτό ενδέχεται να είναι συμπτώματα μιας αύξησης της πίεσης στον οφθαλμό και μπορεί να συμβούν εντός ωρών έως εβδομάδων από τη λήψη του TOPRESS PLUS®. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη διαταραχή της όρασης, εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Όπως και με οποιοδήποτε φάρμακο το οποίο μειώνει την αρτηριακή πίεση, η υπερβολική πτώση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με διαταραχές της ροής του αίματος της καρδιάς ή του εγκεφάλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο γιατρός σας θα ελέγξει συνεπώς την αρτηριακή σας πίεση προσεκτικά.

Το TOPRESS PLUS® μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων των λιπιδίων και του ουρικού οξέος στο αίμα σας (η οποία της ουρικής αρθρίτιδας–επίδηση δύσκολων των αρθρώσεων). Ο γιατρός ίσως θέληρει να κάνει εξετάσεις αίματος τακτικά για να τα ελέγξει.

Μπορεί να μεταβληθούν τα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στο αίμα σας, οι οποίες αναφέρονται ηλεκτρολύτες. Ο γιατρός σας ίσως θέληρει να κάνει εξετάσεις αίματος τακτικά για τον έλεγχο αυτών. Σημάδια των *αλλαγών των ηλεκτρολυτών* είναι: δίψα, εξοστώση, μυϊκή πόνος ή κράμπες, κορροσμένα μύες, χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση), αίσθημα αδυναμίας, κόπωση, ναυτία, υπνηλία ή ανησυχία, ναυτία, έμετος, μικρότερη ανάγκη για ούρηση, ταχύς καρδιακός ρυθμός. **Ενημερώστε τον γιατρό σας αν παρατηρήσετε αυτά τα συμπτώματα.**

Εάν πρόκειται να κάνετε εξέτασης λειτουργίας του παραθυρεοειδούς αδένος πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε το TOPRESS PLUS® πριν τις πραγματοποιήσετε.

Θα πρέπει να να αναφέρετε στον γιατρό σας αν νομίζετε ότι είστε ή μπορεί να μείνετε έγκυος. Το TOPRESS PLUS® δεν ανατέεται στην αρχή της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να να παίρνετε αν είστε περισσότερο από 3 μήνες έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο (βλέπε παράγραφο «Κύηση και θηλασμός»).

Ποια και έρχεται (από τον 18 ετών)

Το TOPRESS PLUS® δεν συντακτεί για παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και TOPRESS PLUS®

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιοί σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:

• Άλλα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, καθώς η επίδραση του TOPRESS PLUS® μπορεί να αείρει. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση σας και/ή να λάβει άλλα φάρμακάς.

• Εάν παίρνετε ένα-MEA ή αλοκαθένη (βλέπε επίσης τις πληροφορίες στο «Μην πάρετε TOPRESS PLUS® εάν» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).

• Το λίκιο (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των διακυμάνσεων της διάθεσης (ανακυμαινόμενος διαταραχή) και κάποιων μορφών κατάθληξης) στην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το TOPRESS PLUS® μπορεί να μείρσει την τοξικότητα του λίκιου. Αν πρέπει να πάρετε λίκιο, ο γιατρός σας θα μετρήσει τα επίπεδα λίκιου στο αίμα σας.

• Διαιταζήμη, βεραμπιλη, που χρησιμοποιούνται για προβλήματα του καρδιακού ρυθμού και για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

• Ριφαμπκίνη, ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, τετρακυκλικές ή σπασρολόζωση, αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη φαρμαζωή ή άλλες λοιμώξεις.

• St. John’s wort (Hypericum perforatum/υπερικό το διάτρητο ή βαλσαμόχορτο), ένα φυτικό φάρμακο για τη θεραπεία της κατάθληξης.

• Σιζαπρίδη, που χρησιμοποιείται για την αύξηση της κυκλοφορίας της τροφής στο στομάχι και το έντερο.

• Αφροαίνης, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του αρχού καρδιακού πόνου ή τη μείωση της εφίδρωσης.

• Αλοκαθένη, που χρησιμοποιείται για την ελονοσία.

• Βουκονίτη IV, που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του νεφρικού συστήματος.

• Αμανταδίνη, που χρησιμοποιείται για τη νόσο του Πάρκινσον.

• Συμπληρώματα καλίου, υποκατάστατα άλατος τα οποία περιέχουν κάλιο, διουρητικά, ηπαρίνη (χρησιμοποιείται για να κάνει το αίμα πιο λεπτότερο και για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων αίματος), α-MEA (για την μείωση της αρτηριακής πίεσης), καθατικά, στεροειδή, αδρενοκορτικογόνο ορμονή (ACTH), καρβονατόλη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ελκών στο στομάχι και το στομάχι), νιτρογύλις πενικιλίνη G (γονοαίτιες επίσης νιτρογύλις βενζολοκεκουλίνη, ένα αντιβιοτικό), ορμόνια πινουλίνου, όπως το σεξ τοξικολογικό οξύ (οσπιρίνη) ή το σοκλικόλη. Χρησιμοποιώντας αυτό το φάρμακο ταυτόχρονα με το TOPRESS PLUS® είναι δυνατό να αείρει τα επίπεδα καλίου στο αίμα σας.

• Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΕΑ), φάρμακο που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο, το πρήξιμο και άλλα συμπτώματα της φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με το TOPRESS PLUS® μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο της νεφρικής ανεπάρκειας. Η επίδραση του TOPRESS PLUS® μπορεί να μείνετε από τα ΜΕΑ. Σε περίπτωση υψηλών δόσεων στελοειδών, μπορεί να αείρει η τοξική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

• Γλυκικά ήπα, ηρωματικά και αντικαταθληπτικά φάρμακα, καθώς η χρήση αυτών των φαρμάκων μαζί με το TOPRESS PLUS® μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης στην όραση όση.

• Την υδροχλωρή κολεσεβέλμη, ένα φάρμακο που μείνει τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα σας, καθώς η επίδραση του TOPRESS PLUS® μπορεί να μείνει. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να πάρετε το TOPRESS PLUS® τουλάχιστον 4 ώρες πριν την υδροχλωρή κολεσεβέλμη.

• Ορμόνια αντόξια (φάρμακα για τη δυσπείρση ή τον υποδοστερηκό κακίο), καθώς η επίδραση του TOPRESS PLUS® μπορεί να μείνει ελαφρά.

• Ορμόνια μυοαλαρωματικά φάρμακα, όπως η ιμακροπρίνη και η τουφωκοπρίνη.

• Αντιθρομβωτικές παράγοντες, όπως η ασπιρίνη και η βιπροδιήνη.

• Συμπληρώματα ασβεστίου.

• Διουρητικά (ουσία προς έγχεση για σοβαρές αναμώλες της θερμοκρασίας του αίματος).

• Σιβεστατίνη, που χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης και των λιπιδίων (τριγλυκεριδίων) στο αίμα.

• Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η ανοσοποιητική απόκριση του οργανισμού σας (όπως τακρολιμύς, κικλοσπορίνη), δύναται τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να δεχθεί το μεταξοζωμένο οργάνο.

Επίσης, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιοί σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει ή μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:

• Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως διαορδίοη, αλκοολοζήση, λεβεραπραζόλη, τριχλωροεζόλη, σουμεπραζόλη, σουμιπραζόλη, φροδοσιπρίδη, πιροζόλη, οσλομεπρίλη, τυπριπρίλη, ερυθροσπρίδη ή αλοκαθένη.

• Φάρμακα για τη θεραπεία του υψηλού σακχάρου στο αίμα (π.χ. διαζαζόλη) ή της υψηλής αρτηριακής πίεσης (π.χ. β-ποδοειδή, μελανιόλη), επειδή το TOPRESS PLUS® μπορεί να επηρεάσει τη δράση τους.

• Φάρμακα για τη θεραπεία προβλημάτων καρδιακού ρυθμού, όπως μιλφοσίνη, πεταμοσίλη, τερεφενόλη, διοφολαήλη, μπιτοσίλη ή ενωσηή ερυθρομυκίνη.

• Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV/AIDS (π.χ. ριτοσιρίνη, νδινοβίρη, νεφρινεβίρη).

• Φάρμακα για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων (π.χ. κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, αμοφοτερίνη).

• Φάρμακα για τη θεραπεία καρδιακών προβλημάτων, όπως κινιδίνη, υδροκινιδίνη, διουροσημίδη, ηρωδαρίνη, σοσταζόλη, μεπροβόλη ή δοκλιταόδη.

• Φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου, όπως αμοφοσίτη, κυκλοφωσφιδίη ή μεστοεζόλη.

• Αύξηση αρτηριακής πίεσης και χαμηλό καρδιακό ρυθμό, όπως νεφροεπάλια.

• Φάρμακα για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας, όπως προμπεξεδίλη, σουφωλαμαζόλη και αλλοπουρινόλη.

• Φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων λίπους στο αίμα, όπως χοληστυραμίνη και κολεστυράλη.

• Φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, όπως η μετροφομίνη ή νιτοσίλη.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιοί σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Το TOPRESS PLUS® με τροφή και ποτό
Το TOPRESS PLUS® είναι δυνατό να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Δεν ονομαζείται η κατανομή χημώ κρέμψροου και κρέμψροου από άτομα που λαμβάνουν το TOPRESS PLUS®. Αυτό συμβαίνει επειδή το κρέμψροου και ο χημώ κρέμψροου μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων του δραστικού συστατικού αρλοδιπίνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει μια ανεπιθύμη αύξηση της αντιυπετασικής δράσης του TOPRESS PLUS®.

Προσέξτε όταν πίνετε αλκοόλ ενώ λαμβάνετε το TOPRESS PLUS®, επειδή ορισμένα ανθρώπινα αισθητόνα λιποθύμια ή ζώη. Εάν αυτο συμβεί σε εσάς, μην πίνετε καθόλου αλκοόλ.

Ηλικιωμένοι

Αν είστε άνω των 65 ετών, ο γιατρός σας θα ελέγξει τακτικά την πίεση σας κάθε φορά που αυξάνεται η δόση, ώστε να βεβαιωθεί ότι η αρτηριακή σας πίεση δεν ελαττώνεται υπερβολικά.

Κύηση και θηλασμός

Κύηση

Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε ή μπορεί να μείνετε έγκυος. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει κανονικά να σταματήσετε τη λήψη του TOPRESS PLUS® πριν μείνετε έγκυος ή μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συμβουλεύσει να λάβετε άλλο φάρμακο αντί του TOPRESS PLUS®. Το TOPRESS PLUS® δεν συντακτεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει

